

# Conseils de lutte contre les campagnols

Fondation Rurale Interjurassienne

## Lutter en priorité sur les prairies de fauche :

### Mettre en culture

Culture de préférence deux années de suite, idéalement mise en place avec labour (minimum 10 cm).

Exemple : marge brute triticales automne extenso : 1700-2200 frs, rendement 40-60 dt/ha.

### Gazer

Gaz PH3 (Polytanol ®) : 70 à 80 % d'efficacité.

Avance seul : environ 1 ha par heure. Travailler à deux augmente l'avance.

Brouettes à gaz : moindre avance, bonne efficacité.

### Au printemps :

Herser, éventuellement faire un déprimage (pâturage 10 jours).

### Rénover les prairies

Sur les parcelles labourables, rénover 20% de la surface chaque année.

Implantation mélange 400 : environ 800 frs/ha.

### Piéger

Pièges Top Cat ou pinces. Avec 10 pièges Top Cat, relevés un fois par jour, un piègeur débutant capture 3 à 5 campagnols.

### Piéger ou gazer en basse densité uniquement !

Ne plus agir sur une prairie dont 50 % de la surface est déjà détruit : **c'est trop tard.**

### A l'automne :

Faire pâturer partout, puis bien faucher les refus s'il y en a.

### Poser des perchoirs :

Mâts de 3 m posés tous les 100 m, avec barre en bois horizontale au sommet.

Les rapaces (buses, milan, faucons, chouettes) consomment plus de 3'000 campagnols par année !

Mesure peu coûteuse et très efficace !!

Les poser sur les bornes entre parcelles permet d'avoir un repère fixe quand on fauche.

### Tas de branches, haies, bosquets

Abri pour les hermines, belettes, renards.

Une hermine consomme environ 400 campagnols par année, un renard environ 3'000.

### Nichoirs

Caisse de 40 cm de large avec une ouverture.

Poser à 5 m de hauteur sur la grange ou dans un arbre.

### L'important : combiner toutes les actions !

Les campagnols c'est comme les rumex : un travail qui paraît difficile, mais qui est payant sur le long terme !