

Ourlets Bandes culturales extensives		
Localisation		
Parcelles mises en culture dans les finages.		
Plantes indicatrices		
	Coquelicot	
Espèces cibles		
	Lièvre brun (menacé)	
Mode d'exploitation de la surface		
- Largeur de bande min. 6 m - Densité de semis à 50 %		
Justification de la mesure		
Le lièvre se reproduit dans des cultures pas trop denses et bien ensoleillées. Le taux de survie des levrauts est le plus élevé dans ces surfaces. Un effet prédation risque de le diminuer dans les bandes trop étroites. La bande extensive est en plus favorable à d'autres espèces (alouette des champs, etc.).		
Rappel des conditions OPD / OTerm / OQE		

OPD	OQE "Qualité"
Ourlet - Uniquement en ZP, ZC, ZM I et ZM II et sur des surfaces d'assolement - Mélange recommandé par Agroscope sauf exceptions sur demande aux autorités cantonales - Entre 3 m et 12 m - Pas de fumure - Lutte phytosanitaire plante par plante ou mécanique - Coupe de nettoyage la première année en cas d'envahissement de mauvaises herbes - Une fauche par an sur la moitié de la surface en alternance d'une année à l'autre - Produit de fauche évacué - Maintien 2 ans minimum - Attention aux exclusions Bande culturale extensive - Bande en bordure de champ - Aménagé dans le sens de la longueur du travail - Céréales, colza, tournesol, pois protéagineux, féveroles ou soja, maïs exclu - Entre 3 m et 12 m - Pas de fumure - Lutte phytosanitaire plante par plante ou mécanique - Sarclage à grande échelle interdit - Pas d'insecticide - Battage à maturité - 2 cultures principales successives sur le même emplacement au minimum	- Pas de contribution