

Alerte varroa

Mois

Altitude

Emplacement du rucher

Nbre total de ruches

Types de ruches

Nbre de ruches contrôlées

Nbre de jours comptés

Chute naturelle méthode par comptage	Méthode par comptage
Ruche no 4	9
Ruche no 9	28
Ruche no 14	14
Ruche no 16	33
Ruche no 23	16
Ruche no 26	36

Méthode par comptage
18
14
20
60
19
67

Total	Varroa/jour Moyenne
27	2.45
42	3.82
34	3.09
93	8.45
35	3.18
103	9.36
Moyenne	5.06

La méthode par lessivage sera effectuée 2 à 3 x par année pour contrôle et slon les besoins

Infestation des abeilles adultes Méthode par lessivage	Poids 30 ab.	Poids échantillon g	Abeilles échantillons
Ruche no 4		28.18	282
Ruche no 9		24.64	246
Ruche no 14		30.61	306
Ruche no 16		27.95	280
Ruche no 23		27.67	277

Varroa échantillon	Varroa/100 ab
1	0.35
9	3.65
2	0.65
3	1.07
3	1.08

Observation au trou de vol

Pas d'observations particulières au trou de vol,

Conduite du rucher / interventions

Dès le 30 juin, plus froid, la balance a plutôt tendance à la baisse.

Contrôle de la chute naturelle des VA 5.07 et 10.7, nombre important de VA.

Comme la météo ne s'annonce pas très belle dans la semaine prochaine, je vais extraire, enlever les hausses et après deux ou trois nourrissements effectuer le 1^{er} traitement à l'acide formique à 70 % avec diffuseur APIDEA.

Attention au développement du VA qui a rapidement augmenter, 1^{er} traitement à faire sans trop tarder en cas de chute importante de VA, à surveiller !