

Alerte varroa

Nbre de jours comptés	10	15	25		
10 jours après traitement		15 jours après le 1er comptage			
Chute naturelle méthode par comptage	Méthode par comptage	Méthode par comptage	Total	Varroa/jour Moyenne	
Ruche no 4	env. 400	moins de 100	500	20	
Ruche no 9	env. 350	moins de 100	450	18	
Ruche no 14	env. 400	moins de 100	500	20	
Ruche no 16	env. 400	moins de 400	800	32	
Ruche no 23	env. 500	moins de 300	800	32	
Ruche no 26	plus de 2000	plus de 500	2500	100	
			Moyenne	37	

La méthode par lessivage sera effectuée 2 à 3 x par année pour contrôle et slon les besoins

Infestation des abeilles adultes Méthode par lessivage	Poids 30 ab.	Poids échantillon g	Abeilles échantillons	Varroa échantillon	Varroa/100 ab
Ruche no 4					
Ruche no 9					
Ruche no 14					
Ruche no 16					
Ruche no 23					
Ruche no 26					
Moyenne					

Observation au trou de vol

Pas d'observations particulières au trou de vol, sauf exclusion importante des faux-bourçons par les abeilles dès début août.

Conduite du rucher / interventions

Extraction le 26 et 27 juillet. Beau miel de miellat, mais récolte moyenne malgré une météo capricieuse en juillet.

Nourrissement au sirop de sucre 3 jours consécutifs dès le 28 juillet, (3 x 1.5 lt)

1^{er} août, traitement de 2 essaims artificiels, mis en ruche sur cire gaufrée le 27 juillet, AO 3% par pulvérisation (sans couvain operculé)

2 août, 1^{er} traitement à AF 70 %, 120 ml, diffuseur APIDEA, ouverture 50 cm², temp. extérieure + 25°, (toutes les colonies)
Enlever les diffuseurs le 12 août, buvard sec.

12 août, contrôle de la chute des VA, 10 jours après le 1^{er} traitement : 20 colonies avec moins de 500 VA, 3 colonies avec 500 à 1000 VA et 2 colonies avec plus de 2000 VA

16 et 20 août, nourrissement stimulant au sirop (2 x 1 lt) et introduction des nouvelles reines 2011

24 et 26 août, nourrissement au sirop (2 x 1.5 lt).

27 août, 2^{ème} contrôle VA, (15 jours après le 1^{er} contrôle) : 10 colonies avec moins de 200 VA, 10 avec moins de 300 VA, 4 avec moins de 400 VA et 1 avec plus de 400 VA.

Le 27 août, je vais profiter des bonnes conditions de la météo pour effectuer le 2^{ème} traitement à l'AF, 70%, 120 ml, diffuseur APIDEA.

Il faut attendre le résultat du 2^{ème} traitement et analyser la chute naturelle journalière par comptage à fin septembre pour savoir exactement le taux d'infestation de VA.