

# Alerte varroa

Mois

Altitude

Emplacement du rucher

Nbre total de ruches

Types de ruches

Nbre de ruches contrôlées

Nbre de jours comptés   
2 au 8 avril

8 au 15 avril

Chute naturelle méthode par comptage	Méthode par comptage
Ruche no 1	0
Ruche no 3	0
Ruche no 5	1
Ruche no 7	0
Ruche no 11	0

Méthode par comptage
0
0
0
1
0

Total	Varroa/jour Moyenne
0	0.0
0	0.0
1	0.1
1	0.1
0	0.0
<b>Moyenne</b>	<b>0.0</b>

La méthode par lessivage sera effectuée 2 à 3 x par année pour contrôle et slon les besoins

Infestation des abeilles adultes Méthode par lessivage	Poids 30 ab.	Poids échantillon g	Abeilles échantillons
Ruche no 1			
Ruche no 3			
Ruche no 5			
Ruche no 7			
Ruche no 11			

Varroa échantillon	Varroa/100 ab

## Observation au trou de vol

Très peu d'abeilles mortes sur la planchette de vol. Abeilles très actives, en début de mois apport de pollen (noisetier et saule); actuellement pollen et miel de pissenlit.

La fausse-teigne s'est déjà bien développée. Prenez soin des cadres déjà bâties dans vos armoires, surtout s'il y a des alvéoles garnies de pollen.

Par rapport à l'an dernier j'ai compté 5x moins de chutes de varroa à la même période en avril que cette année. Probablement que les 2 traitements à l'acide formique et les 2 à l'acide oxalique (entre début août 2010 et début février 2011) ont été assez efficaces. Même en constatant une diminution actuel du varroa, il faut rester très vigilant. Cette année, en avril, les plaques de couvain sont déjà très développées et pensez-y le varroa connaît ainsi une croissance plus forte déjà au printemps et se multipliera en plus grand nombre les mois suivants et risque d'affaiblir vos ruches avant la fin juillet, moment des premiers traitements. Contrôler régulièrement, dans les prochains mois la chute des varroas, sur quelques ruches de votre rucher.

## Conduite du rucher / interventions

Avant la fin mars placé un cadre à faux bourdons dans chaque ruche. Le 1<sup>er</sup> et 9 avril introduit une feuille de cire gaufrée à construire. La semaine prochaine j'ajouterai la 3<sup>e</sup> cire gaufrée à quelques ruches. Dans une dizaine de jours si le temps se maintient au beau et que la température augmente un peu, je poserai les hausses sur les corps de ruche.