

Alerte varroa

Mois

Altitude

Emplacement du rucher

Nbre total de ruches

Types de ruches

Nbre de ruches contrôlées

Nbre de jours comptés
5 au 10 juin

10 au 15 mai

Chute naturelle méthode par comptage	Méthode par comptage
Ruche no 1	5
Ruche no 3	8
Ruche no 5	5
Ruche no 7	10
Ruche no 11	2

Méthode par comptage
9
3
5
8
2

Total	Varroa/jour Moyenne
14	1.40
11	1.10
10	1.00
18	1.80
4	0.40
Moyenne	1.14

La méthode par lessivage sera effectuée 2 à 3 x par année pour contrôle et slon les besoins

Infestation des abeilles adultes Méthode par lessivage	Poids 30 ab.	Poids échantillon g	Abeilles échantillons
Ruche no 1			
Ruche no 3			
Ruche no 5			
Ruche no 7			
Ruche no 11			

Varroa échantillon	Varroa/100 ab

Observation au trou de vol

Passablement de faux-bourçons repoussés sur la planchette d'envol.

Conduite du rucher / interventions

Avant la fin mai les provisions ont diminuées dans les corps de ruche. L'occasion fut idéale pour pendre des abeilles dans les hausses des ruches fortes pour faire quelques nucléis.

Après le 6 juin la balance regarde vers le haut, les abeilles rapportaient du miel de tilleul et du feuillu. Le sapin peut encore donner une récolte.

Ces dernières semaines j'ai constaté une importante croissance de varroa dans mes ruches.