

Alerte varroa

Chute naturelle méthode par comptage	Méthode par comptage
Ruche no 1	13
Ruche no 3	12
Ruche no 5	21
Ruche no 7	16
Ruche no 11	17

Méthode par comptage
25
26
22
18
18

Total	Varroa/jour Moyenne
38	3.80
38	3.80
43	4.30
34	3.40
35	3.50
Moyenne	3.76

La méthode par lessivage sera effectuée 2 à 3 x par année pour contrôle et slon les besoins

Infestation des abeilles adultes Méthode par lessivage	Poids 30 ab.	Poids échantillon g	Abeilles échantillons
Ruche no 1		32.02	320
Ruche no 3		34.10	341
Ruche no 5		37.10	371
Ruche no 7		46.31	463
Ruche no 11		61.91	619
Moyenne			

Varroa échantillon	Varroa/100 ab
11	3.44
1	0.29
7	1.89
1	0.22
5	0.81

Observation au trou de vol

Passablement de faux-bourçons repoussés sur la planchette d'envol. Vu deux abeilles avec des ailes atrophiées.

Conduite du rucher / interventions

Le 4 et 5 juillet extrait une hausse complètement operculée sur chaque ruche. Dès que la température sera plus élevée et surtout si les abeilles ne rapportent plus de miel, j'extrais tout ce qui se trouvera dans les hausses.

Le seuil des chutes de varroa par comptage est très élevé, 4 à 5 fois plus nombreux qu'il y a exactement une année à la même époque. Si vous connaissez la même infection, je ne pourrai que vous conseiller de faire le premier traitement contre les varroas encore avant la fin juillet.

Lors de la dernière récolte, profitez de prendre les jeunes abeilles sur les hausses et de faire des nucléés en y introduisant une jeune reine et en les nourrissant abondamment.