

Alerte varroa

juillet

Altitude 480

Bassecourt

Nbre total de ruches 12

Schneider

Nbre de ruches contrôlées 5

15

1er au 15 août

Méthode par comptage
2032
2764
1598
846
1413

5

15 au 20 août

Méthode par comptage
255
185
327
102
176

20

Total	Varroa/jour Moyenne
2287	114.35
2949	147.45
1925	96.25
948	47.40
1589	79.45
Moyenne	96.98

Le lessivage sera effectuée 2 à 3 x par année pour contrôle et slon les besoins

Poids 30 ab.	Poids échantillon g	Abeilles échantillons

Varroa échantillon	Varroa/100 ab

Observation au trou de vol

Passablement de faux-bourdons délaissés sur la la planchette d'envol ainsi que quelques abeilles mortes.

Conduite du rucher / interventions

Le 29 et 30 juillet extraction de la dernière récolte de miel sur toutes les ruches.

Le 30 juillet au soir, nourrissage. Toutes les ruches ont reçu entre 0,5 et 1 l d'eau sucrée.

Le 1er août, 130 ml d'acide formique 70° réparti dans tous les diffuseurs et toutes les ruches.

Le 18 août les diffuseurs ont été enlevé, puis reprise du nourrissage, à petites doses.