

Alerte varroa

Mois

Altitude

Emplacement du rucher

Nbre total de ruches

Types de ruches

Nbre de ruches contrôlées

Nbre de jours comptés
5 au 10 sept

10 au 15 sept

Chute naturelle méthode par comptage	Méthode par comptage
Ruche no 1	32
Ruche no 3	57
Ruche no 5	56
Ruche no 7	124
Ruche no 11	126

Méthode par comptage
21
64
80
128
129

Total	Varroa/jour Moyenne
53	5.30
121	12.10
136	13.60
252	25.20
255	25.50
Moyenne	16.34

La méthode par lessivage sera effectuée 2 à 3 x par année pour contrôle et slon les besoins

Infestation des abeilles adultes Méthode par lessivage	Poids 30 ab.	Poids échantillon g	Abeilles échantillons
Ruche no 1			
Ruche no 3			
Ruche no 5			
Ruche no 7			
Ruche no 11			

Varroa échantillon	Varroa/100 ab

Observation au trou de vol

Depuis le mois d'août les abeilles sont peu actives.

Conduite du rucher / interventions

Toutes les ruches ont leur quantité suffisante de nourriture.

L'activité a repris ces derniers jours: le lierre fleuri, ce qui donne un apport en pollen et en miel.

La semaine prochaine un nouveau traitement aura lieu.

Dès que le temps deviendra plus frais, les vieux cadres ou les cadres de hausse qui ont contenu du couvain seront fondus.