

# Alerte varroa

Mois

Altitude

Emplacement du rucher

Nbre total de ruches

Types de ruches

Nbre de ruches contrôlées

Nbre de jours comptés

5 au 10 nov

10 au 15 nov

Chute naturelle méthode par comptage	Méthode par comptage
Ruche no 1	0
Ruche no 3	1
Ruche no 5	2
Ruche no 7	4
Ruche no 11	2

Méthode par comptage
1
1
4
0
1

Total	Varroa/jour Moyenne
1	0.10
2	0.20
6	0.60
4	0.40
3	0.30
<b>Moyenne</b>	<b>0.32</b>

La méthode par lessivage sera effectuée 2 à 3 x par année pour contrôle et slon les besoins

Infestation des abeilles adultes Méthode par lessivage	Poids 30 ab.	Poids échantillon g	Abeilles échantillons
Ruche no 1			
Ruche no 3			
Ruche no 5			
Ruche no 7			
Ruche no 11			

Varroa échantillon	Varroa/100 ab

## Observation au trou de vol

De temps en temps une abeille de morte sur la planchette de vol, ce qui est tout à fait normal.

## Conduite du rucher / interventions

Les abeilles ont trouvé leur repos d'hiver.

Les traitements à l'acide oxalique peuvent se faire actuellement, même si la chute des varroas a passablement diminué depuis une quinzaine de jours.