

Alerte varroa

Mois

Altitude

Emplacement du rucher

Nbre total de ruches

Types de ruches

Nbre de ruches contrôlées

Nbre de jours comptés
2- 11.07.11

Chute naturelle méthode par comptage	Méthode par comptage
Ruche no 1	2
Ruche no 2	2
Ruche no 4	6
Ruche no 5	6
Ruche no 7	0

Méthode par comptage

Total	Varroa/jour Moyenne
2	0.2
2	0.2
6	0.7
6	0.7
0	0.0
Moyenne	0.36

Infestation des abeilles adultes au 11.07.11 Méthode par lessivage	Poids 50 ab. (g)	Poids échantillon (g)	Abeilles échantillons
Ruche no 1	6.75	52.3	232
Ruche no 2	5.32	54.6	308
Ruche no 4	5.41	60.3	334
Ruche no 5	6.98	65.8	283
Ruche no 7	5.54	52.1	282
Moyenne			288

Varroa échantillon	Varroa/100 ab
0	0.00
0	0.00
0	0.00
2	2.12
1	1.06
0.6	0.64

Conduite du rucher / interventions

Cette année, tendance forte et précoce à l'essaimage probablement due aux conditions climatiques particulières du printemps. Presque toutes les colonies ont soit essaimées ou j'ai prélevé un nuclé. Ceci a eu un effet négatif sur la récolte de printemps. Ces jeunes colonies doivent être suivies en juillet afin qu'elles ne manquent ni de nourriture ni de place. Les anciennes reines vertes (2009) ont été remplacées.

Varroa

Sur le rucher de Nods, je n'observe aucun indice de varroose que les comptages de la chute naturelle et de l'infestation des abeilles adultes viennent confirmer. La bonne efficacité du traitement de l'hiver passé et l'absence de réinfestation des ruchers alentours en est certainement la raison. Il faut cependant noter que cette situation n'est pas vraiment représentative de la situation en Suisse. En effet, j'ai reçu de nombreuses annonces d'apiculteurs qui pratiquent le comptage de la chute naturelle de Varroa et qui observent des infestations beaucoup plus importantes que l'année passée à pareille époque. Je conseille donc à tous les apiculteurs de déhausser fin juillet au plus tard et de traiter rapidement leur colonies. Plus on commence tôt, plus on a de chance d'avoir des abeilles d'hiver en santé et avec une longue durée de vie. Je conseille également d'effectuer systématiquement 2 applications de longue durée à l'acide formique ou un traitement à base de thymol sur une durée de 6 semaines au minimum.