

Alerte varroa

Mois

Altitude

Emplacement du rucher

Nbre total de ruches

Types de ruches

Nbre de ruches contrôlées

Nbre de jours comptés
1- 6.08.11

Chute naturelle méthode par comptage	Méthode par comptage
Ruche no 1	2
Ruche no 2	4
Ruche no 4	8
Ruche no 5	17
Ruche no 7	10

Méthode par comptage

Total	Varroa/jour Moyenne
2	0.4
4	0.8
8	1.6
17	3.4
10	2.0
Moyenne	1.64

Chute traitement AF 1er traitement acide formique longue durée Diffuseur FAM-Liebefeld, 6.08.2011	06 - 13.08.2011	13 - 21.08.2011	21.08- 27.08.2011	27.08- 4.09.11	Total
ruche no 1	13	11	12	7	43
ruche no 2	28	16	6	7	57
ruche no 4	122	95	37	38	292
ruche no 5	129	92	21	15	257
ruche no 7	62	54	4	5	125
Moyenne	71	54	16	14	155

Conduite du rucher / interventions

Après le 1^{er} traitement à l'acide formique, procède au contrôle des reines (pas de reines perdues) et profite de changer 2 anciennes reines. La colonie 5 n'a pas une reine satisfaisante et comme elle s'est passablement affaiblie ces dernières semaines, je vais la réunir avec un nuclé de l'année. A cette période de l'année, ces réunions se font généralement sans problème. Au pire des cas, on peut séparer les deux colonies par une feuille de papier avec quelques perforations afin d'avoir une réunion tout en douceur.

Varroa

Traitement à l'acide formique longue durée avec le diffuseur FAM le 6 août 2011. Sur la base des chutes naturelles, je sais que mes colonies sont peu infestées et ceci est corroboré par les faibles chutes de traitement.

Ceci ne correspond pas cependant à la situation classique en Suisse. En effet, j'ai reçu beaucoup d'annonces faisant état d'infestation par Varroa très importantes. Cette année, il sera très important d'avoir débuté les traitements estivaux le plus tôt possible pour éviter le plus possible les pertes hivernales. Les populations d'abeilles d'hiver sont élevées en août et surtout septembre et il est primordial que ces abeilles ne soient pas trop parasitées durant leur développement larvaire et pupal. Malgré ces faibles infestations sur ce rucher de Nods, je prévois de réaliser le 2^{ème} traitement à l'acide formique à la mi-septembre. Ceci me sonne le temps de finir le nourrissage d'ici là.