

# Alerte varroa

Mois

Altitude

Emplacement du rucher

Nbre total de ruches

Types de ruches

Nbre de ruches contrôlées

Nbre de jours comptés

11 au 15 avril

18 au 22 avril

total de jours

Chute naturelle méthode par comptage	Méthode par comptage
Ruche no 1	5
Ruche no 2	4
Ruche no 4	6
Ruche no 9	3
Ruche no 11	3
Ruche no	

Méthode par comptage
10
2
5
6
4

Total	Varroa/jour Moyenne
15	2
6	1
11	1
9	1
7	1
0	0
<b>Moyenne</b>	<b>1</b>

La méthode par lessivage sera effectuée 2 à 3 x par année pour contrôle et selon les besoins

Infestation des abeilles adultes Méthode par lessivage	Poids 30 ab.	Poids échantillon g	Abeilles échantillons
Ruche no 1			
Ruche no 2			
Ruche no 3			
Ruche no 4			
Ruche no 5			

Varroa échantillon	Varroa/100 ab

## Observation au trou de vol

Apports importants de pollen et de miel durant ces 4 semaines, les ruches un peu plus faibles ce sont très bien renforcées.

## Conduite du rucher / interventions

Début avril : 1 à 2 cires gaufrées aux plus fortes.

Introduction du cadre à faux-bourçons

5 avril : pose des premières hausses

23 avril : double hausse à toutes les ruches.

Découpe du cadre à faux-bourçons le 27 avril.

2 mai : visité 5 ruches avec double hausse - operculé au ¾. - testé au réfractomètre à 19% d'humidité, d'ici 10 jours à contrôler de nouveau pour prévoir l'extraction.

Ruche no 4 - très forte : 2 cellules royales - fait un nucléi.