

Alerte varroa

Mois

Altitude

Emplacement du rucher

Nbre total de ruches

Types de ruches

Nbre de ruches contrôlées

Nbre de jours comptés

Chute naturelle méthode par comptage	Méthode par comptage
Ruche no 1	
Ruche no 2	
Ruche no 4	
Ruche no 9	
Ruche no 11	
Ruche no	

Méthode par comptage
55
34
15
154
15

Total	Varroa/jour Moyenne
55	11
34	7
15	3
154	31
15	3
Moyenne	11

La méthode par lessivage sera effectuée 2 à 3 x par année pour contrôle et selon les besoins

Infestation des abeilles adultes Méthode par lessivage	Poids 30 ab.	Poids échantillon g	Abeilles échantillons
Ruche no 1			
Ruche no 2			
Ruche no 4			
Ruche no 9			
Ruche no 11			

Varroa échantillon	Varroa/100 ab

Observation au trou de vol

Expulsion des faux-bourçons - malgré la forte infestation des ruches peu d'abeilles difformes.

Conduite du rucher / interventions

1^{ère} semaine d'août nourrissage à toutes les ruches. Du 11 au 20 août traitement à l'AF.

Très forte infestation des ruches. Les conditions météo étaient favorables et la chute des varroas considérable.

Total de varroas tombés durant les 7 premiers jours du traitement

ruche no 1 : 2400 varroas

ruche no 2 : 990 "

ruche no 4 : 1075 "

ruche no 9 : 5020 "

ruche no 11: 910 " - 10 jours après avoir retiré les diffuseurs, comptage des varroas pendant 5 jours

résultats ci-dessus.

2eme nourrissage à toutes les ruches

Changé les reines de la ruche no 2 et no 9

2eme traitement à l'AF prévu le 10 septembre.