

Cercosporiose



Taches de Cercosporiose sur feuille de betterave. Photo FRI

Nom :	Cercosporiose – <i>Cercospora beticola</i>
Période de présence :	A partir de mi-juin.
Symptômes :	Des petites taches rondes de 2 à 3 mm apparaissent sur les plus vieilles feuilles. Les taches gris-brun sont entourées d'un liseré brun-rouge à violet avec au centre un feutrage de points noirs. Les feuilles peuvent se dessécher en cas d'attaque importante.
Dégâts possibles :	La cercosporiose peut provoquer une forte réduction de la surface d'assimilation et une production multiple de nouvelles feuilles, ce qui mène à des pertes considérables de rendement et à une baisse de la teneur en sucre des betteraves.
Lutte préventive:	Enfouir proprement par un labour les restes de plantes. Utiliser des variétés tolérantes.
Lutte directe:	<p>Seuils d'intervention :</p> <p>Dès mi-juillet, 1 à 2 plantes faiblement attaquées par are ou un gros foyer dans la parcelle ;</p> <p>D'août à début septembre, 1 à 2 petits foyers par are avec 2-3 plantes clairement attaquées ou un gros foyer dans la parcelle.</p> <p>Un seul traitement peut être suffisant s'il a lieu au début de l'apparition de la cercosporiose et en cas de faible attaque. En cas de forte pression, une deuxième voire un troisième traitement, environ 3 semaines après la précédente intervention, peut s'avérer nécessaire.</p> <p>Il est important d'alterner les matières actives afin d'éviter le développement de résistances.</p> <p>Dernier délai pour l'application d'un fongicide : 6 semaines avant la date de récolte.</p>