

Ramulariose



Taches de Ramulariose sur feuille de betterave. Photo IPA

Nom :	Ramulariose – <i>Ramularia beticola</i>
Période de présence :	A partir de mi-juillet.
Symptômes :	Des petites taches rondes de 2 à 10 mm apparaissent sur les plus vieilles feuilles. Les taches gris-brun sont entourées d'un liseré brun et présentent sur toute leur surface une sporulation (conidies).
Dégâts possibles :	La ramulariose peut provoquer une réduction de la surface d'assimilation. Les dégâts sont moins importants que ceux causés par la cercosporiose.
Lutte préventive:	Enfouir proprement par un labour les restes de plantes. Utiliser des variétés tolérantes.
Lutte directe:	Lutter contre la ramulariose au même moment et avec les mêmes produits que la cercosporiose. Il ne faut toutefois pas en tenir compte lors des premiers contrôles de cercosporiose, car son importance est nettement plus faible.
Remarques:	<p>Les symptômes sont quasiment identiques que ceux de la cercosporiose. Les taches sont toutefois légèrement plus grandes.</p> <p>A la différence de la cercosporiose, la ramulariose se développe à basse température et donc plus tôt dans la saison, mais l'évolution de l'épidémie est cependant beaucoup plus lente.</p> <p>Dernier délai pour l'application d'un fongicide : 6 semaines avant la date de récolte.</p>