

## Vers gris – chenilles de diverses noctuelles



<b>Nom :</b>	Ver gris – <i>Agrostis</i> spp.
<b>Symptômes :</b>	Les vers gris creusent des trous sur toutes les parties aériennes des plantes, ou les dévorent complètement. La présence de chenilles grisâtres dans le sol près du collet est visible.
<b>Dégâts possibles :</b>	Les chenilles, mesurant jusqu'à 5 cm de long, rongent les racines à la hauteur du collet. Plusieurs plantes consécutives sont attaquées.
<b>Lutte préventive:</b>	Du fait de leur polyphagie et de leurs rythmes de développement très différents, il n'existe pas de méthode réellement efficace. De plus, les insectes adultes sont migrants, mais heureusement <u>plutôt rares en région jurassienne</u> .
<b>Lutte directe:</b>	<p>Un travail du sol intensif et l'apport important de cyanamide calcique permettent de réduire les populations. Une lutte directe est possible en utilisant des appâts dès que le seuil est atteint. <b>La pulvérisation est soumise à autorisation en PER.</b></p> <p>Le seuil d'intervention est atteint à partir de la levée, dès que 5% des plantes sont attaquées. Traiter uniquement les parties de champs attaquées.</p>
<b>Remarques:</b>	Les chenilles sont souvent invisibles dans la journée, mais leur présence est révélée par leurs déjections vert foncé.