



Mesures de prévention des maladies

Chez les veaux



Chez les vaches



Th. Complémentaire : thérapie complémentaire ; **< 10 veaux** : cases individuelles avec max 10 veaux ; **Ad libitum** : pour l'abreuvement ; **Litière** : litière sèche, abondante et renouvelée régulièrement ; **Aération** : logement aéré sans courant d'air ; **Quarantaine** : 10 j après naissance ou achats de veaux ; **Vide sanitaire** : pour les cases individuelles ou entre les groupes


Technique traite : attention portée lors de la traite (contrôle 1^{er} jets, mamelles, etc.) ; **Hygiène traite** : lingettes individuelles, produit trempage, propreté mamelles ; **Tarissement sélectif** : max 1/3 des vaches tarées avec antibiotiques ; **Confort** : litière abondante et/ou pâture intégrale ; **Vêlage** : minimiser stress lors du vêlage (box vêlage, séparation troupeau, etc.) ; **Ration** : contrôle de la ration (teneurs en énergie et azote)

Chez les veaux, les pratiques les plus courantes en élevages bovin lait et viande pour **diminuer la pression microbienne dans le logement** sont la qualité de la litière, le vide sanitaire et la mise en quarantaine. L'important est aussi la **prévention des maladies respiratoires** en veillant à la qualité de l'air (aération, groupes inférieurs à 10, logement à l'extérieur).


Chez les vaches, le **confort, l'attention portée autour du vêlage et à la ration** sont les pratiques les plus courantes en élevage bovin lait et viande. La **technique et la bonne hygiène de traite** sont réalisées en majorité. En cas d'absence, la note prévention de la santé est faible. Les thérapies complémentaires sont aussi un bon indicateur de la prévention de la santé.

Prévenir le parasitisme des bovins

Traitements



Mesures de prévention



- Prévenir le parasitisme chez les bovins consiste à diminuer les traitements ou mieux cibler les animaux les plus sensibles, sans effets négatifs sur la productivité ou la santé des animaux ;
- En élevage bovin lait, l'alternance **fauche-pâturage** est la mesure la plus courante pour **prévenir le parasitisme**. En élevage bovin viande, c'est principalement la **prise en compte des pâtures à fort potentiel parasitaire** dans la gestion du pâturage. Une mesure commune aux deux types d'élevages est l'**analyse coproscopique** pratiquée par 40% des éleveurs et éleveuses.
- Dans notre échantillon, le recours systématique aux bolus est peu courant.
- Plus de **40 % des éleveurs et éleveuses** de l'échantillon, tous élevages confondus, **ne traitent pas du tout les vaches**.
- Les élevages laitiers traitent plus souvent les animaux que les élevages allaitants.