

BULLETIN D'INFORMATION PHYTOSANITAIRE N° 8/2025

Céréales d'automne

Stade : Orge : Maturité pâteuse (CD75).

Blé : Fin floraison à maturité aqueuse (CD69-71) en plaine. Epiaison en montagne (C51-59).

Maladies foliaires : Dans les blés d'automne, la septoriose est montée sur les F3, parfois plus haut. Il y a très peu d'autres maladies foliaires selon notre réseau d'observation. Dans tous les cas, il est trop tard pour intervenir.

Maladies de l'épi : En blé d'automne, il est possible d'agir contre la fusariose sur épi jusque au début de la floraison dans les situations à risque (voir notre dernier bulletin). Passé ce stade, tout traitement fongicide est inutile. Il est encore trop tôt pour observer d'éventuelles attaques de fusariose sur épi.

Ravageurs : Les criocères sont présents partout mais toujours largement en-dessous du seuil d'intervention. Les pucerons sont actuellement peu présents sur les épis.

Désherbage manuel : Il est encore temps d'arracher les chardons des champs, les rumex et repousses de betteraves.

Betteraves

Stade : Entre début de fermeture de l'interligne et recouvrement total (CD31-39).

Charançon de la betterave : Les premières larves sont visibles dans les pétioles des betteraves les plus avancées. Pour rappel, le charançon était déjà bien présent en 2024 sans avoir causé de pertes significatives. Cependant, les dégâts pourraient arriver plus tardivement à cause des pourritures favorisées par les galeries dans les racines ; ceci dépendra fortement des conditions météo jusqu'à la récolte.

Cercosporiose : Les premières taches de cercosporiose ont été observées dans certaines parcelles (les plus avancées) de notre réseau d'observation. Soyez vigilants et observez vos cultures ! En cas d'attaque, si le seuil d'intervention est atteint (1 à 2 plantes légèrement atteintes par are ou 1 foyer plus important dans la parcelle), il est possible d'appliquer un fongicide à base de triazole, éventuellement combiné à une strobilurine (seulement au premier traitement). Il est important de traiter tôt le matin lorsque l'air est humide et les stomates ouverts (*FT Agridea 3.5.3-4*).

Engrais foliaire : La période plus sèche qui est annoncée va accentuer les risques de carence en bore. Il est possible d'apporter un engrais foliaire tel que Borstar, Goëmar Multi, Maneltra Bore plus, Micro Bor et Photrel Pro jusqu'à la fermeture de interlignes (*FT Agridea 3.5.5*). Une telle application doit être faite le matin sur feuillage ressuyé.

Pomme de terre

Stade : Entre formation des boutons floraux et floraison (CD51-65).

Mildiou : Un premier foyer a été détecté le 10 juin à Bourrignon à proximité d'une parcelle infestée de mildiou l'année passée.

Nous vous prions de prendre toutes les mesures préventives nécessaires pour éviter tant que possible les nouvelles infections (voir notre dernier bulletin).

En cas de foyer présent dans la parcelle, nous vous conseillons de défaner ou d'éliminer rapidement les foyers puis d'appliquer deux traitements à intervalle de 3-4 jours avec un fongicide translaminaire doté d'une bonne action sur les spores (cymoxanil, mandipropamide, dimétomorphe) en mélange avec un contact sporicide (amisulbrom, cyazofamide, fluazinam) (*FT Agridea 4.5.3-5*).

Nous vous prions d'annoncer tout foyer de mildiou à la station phytosanitaire ou sur phytopre (www.phytopre.ch).

Ravageurs : Les doryphores sont en augmentation. Il est conseillé d'agir d'abord avec du spinosad (Audienz, Elvis) avant d'utiliser les autres matières actives. Cependant, afin d'éviter les risques de résistance au spinosad, il est désormais possible de commencer avec l'application d'un insecticide à base d'acétamipride ou avec Coragen.

Maïs

Stade : Très variable, entre 4 et 10 feuilles (CD 14-19).

Désherbage : Il est encore possible d'agir contre les adventices avec des sulfonilurées combinées jusqu'au stade 8 feuilles du maïs. En cas de présence importantes de vivaces, il est possible de compléter le traitement avec du Dicamba (*FT Agridea 5.3.7-8*). Attention, en cas de pluie, attendre 48h afin que la cuticule du maïs puisse être reformée.

Pyrale : Les fabricants organiseront les envois de trichogrammes afin que les lâchers puissent être faits vers la fin juin. Les dates précises de lâcher seront communiquées ultérieurement par les fabricants.

Tournesol

Stade : Les cultures les plus avancées ont déjà atteint le stade du bouton floral visible entre les plus jeunes feuilles (CD51).

Pucerons : Les feuilles sont fréquemment gaufrées à cause de la pression importante des pucerons mais ceci n'aura pas d'influence significative sur les rendements.

Désherbage : Le sarclage est possible jusqu'à la fermeture des interlignes. Passé ce stade, les cultures sont trop avancées pour pratiquer le désherbage mécanique sans provoquer de dégâts sur le tournesol.

SPB herbagères

La date du 15 juin approche à grand pas, il sera temps de faucher et récolter les surfaces de promotion de la biodiversité à vocation fourragère (prairies peu intensives et les prairies extensives) en zone de plaine

et en zone des collines. Pour les zones de montagne I et II, il faudra attendre le 1^{er} juillet. En cas de problème d'envahissement par le rhinanthé crête-de-coq, il est possible d'obtenir une dérogation pour fauche anticipée auprès du Service de l'économie rurale en passant par la plate-forme Acorda. Une fauche précoce est très efficace pour faire reculer cette plante parasite envahissante.

En cas de problème avec des autres espèces envahissantes, il est également possible d'obtenir une dérogation pour appliquer des mesures de lutte particulière.

La Station phytosanitaire est à disposition pour vous apporter les conseils pour une lutte efficace.

Pâturages

Le séneçon jacobée commence à fleurir dans les pâturages en plaine, il est important de l'arracher afin d'éviter sa multiplication. Pour rappel, cette plante est toxique pour le bétail même en fourrage sec ou en ensilage.

Station phytosanitaire cantonale

**P.P. A
2852 Courtételle
Poste CH SA**

Case Postale 65
2852 Courtételle
T 41 32 545 56 00
info@frij.ch
www.frij.ch

Fondation
Rurale
Interjurassienne

COURTEMELON LOVERESSE