



ENVIRONNEMENT | AGRICULTURE | FILIÈRES ALIMENTAIRES | INTENDANCE | FORMATION | CONSEILS | FIDUCIAIRE | EXPERTISE

Séances d'informations phytosanitaires 2026

Vergerette annuelle : reconnaissance et lutte dans les jachères et prairies extensives

Emmanuel Brandt

T 032 /545 56 65

Emmanuel.brandt@frij.ch
www.frij.ch


Fondation
Rurale
Interjurassienne

COURTEMELON LOVERESSE

2852 Courtételle | 032 545 56 00 | www.frij.ch | frij@frij.ch

Contexte et problématique

- Espèce originaire d'Amérique du Nord
- Introduite en Europe comme plante décorative
- Rarement à plus de 1000m d'altitude
- Population en pleine expansion → menace la flore indigène
- Organisme exotique envahissant (ODE)
- Observée dans des milieux maigres à végétation sensible (prairie extensive et jachères)



Description de l'espèce

- Plante de 30 à 100 cm
- Tige rameuse vers le haut
- Feuilles velues sur les deux faces
- Feuilles lancéolées et dentées
- Fleurs à cœur jaune et ligules blanches fines
- Racines peuvent aller jusqu'à 1 m de profondeur
- Floraison : juin à octobre



Description de l'espèce



- Cycle de reproduction sur 1-2 ans (annuelle qui peut devenir vivace)
- Reproduction asexuée → pas de fécondation nécessaire



Description de l'espèce



Confusion possible



Marguerite*



Pâquerette



Camomille

*fait partie des mélanges jachères florale

Confusion possible



Vergerette



Marguerite

Contexte et problématique

- Plante invasive dans les prairies extensives et jachères
- Baisse de la biodiversité et modification de la structure de la végétation
- Capable de produire un grand nombre de graines (50'000) dispersées par le vent
- Capacité germinative des graines (5 ans)
- Capacité de propagation très élevée → difficulté à contrôler la plante une fois installé




Raisons de sa persistance

- Hiverne sous forme de rosette (grand potentiel de re infestation)
- Capable de repousser rapidement après fauche et pâture
- Peut fleurir en conditions défavorables
- Présente une grande plasticité écologique (s'adapte rapidement)
- Repousse rapidement après une fauche



Stratégies de lutte

- **Arrachage : seule méthode efficace → arrachage à la main dès la mi-mai (espèce facile à déraciner)**
- **Elimination : plante avec fleurs et graines → ordures ménagères ou centrales d'incinération**
- **Méthode chimique : Glyphosate en plante/plante (excepté en SPB) ou en plein. Destruction possible sous demande à l'ECR → Attention à la Q1, Q2, Réseau**
- **Broyages/fauches répétés non conseillés car gros risques de rendre la plante vivace**



Entretien PE et Jachère (rappel)

Prairies extensives



Utilisation

- Au moins une coupe dès le 15 juin (ZP – ZC), 1er juillet (ZM I, II), 15 juillet (ZM III, IV)
- Pâture d'automne du 1er septembre au 30 novembre possible
- Broyage interdit
- Le produit de la fauche ne doit pas être broyé lors de la fauche, il doit être exporté.
- Tas de branches et de litière autorisés comme refuges pour la faune

Jachères florales

Entretien

- Coupe de nettoyage autorisée durant la 1ère année en cas d'envahissement par des mauvaises herbes
- Dès la 2ème année, fauche autorisée entre le 1er octobre et le 15 mars sur la moitié de la surface seulement
- Pas d'obligation d'exporter le produit de la fauche
- Travail superficiel du sol admis sur la surface fauchée
- Broyage admis



Conclusion



Espèce très résistante aux pratiques de gestion classiques



Pour être efficace → lutte précoce, répétée et ciblée sur la production de graines → et non seulement sur la biomasse

Questions ???